

Ratgeber zur Operation

Kopf hoch!

Bin doch kein
(Angst)hase

Operationstermin

Tiername:

OP-Indikation:

Datum:

Uhrzeit:

Tierarztstempel

Ein Service von **Metacam** 





Lieber Tierhalter!

Sie haben mit Ihrem Tierarzt einen Operationstermin für Ihr Heimtier vereinbart. Heimtiere unterscheiden sich nicht nur in ihren Haltungsansprüchen sehr von Hund und Katze, sondern sind auch bei operativen Eingriffen anders zu versorgen.

Grundsätzlich bestehen bei jeder Narkose und jeder Operation immer Risiken – auch bei einem gesunden Tier und während eines Routineeingriffes.



Deshalb

Helfen Sie mit, diese Risiken zu minimieren, indem Sie die nachfolgenden Hinweise – speziell für Heimtiere – beachten.



Schmerzmittel

Jeder chirurgische Eingriff bringt zwangsläufig auch Schmerzen mit sich. Das ist leider unvermeidbar.

Glücklicherweise stehen neben vielen guten und sicheren Narkosemöglichkeiten hochwirksame und gut verträgliche Schmerzmittel zur Verfügung. Einen Tag vor der Operation und einige Tage danach verabreicht, vermindern sie den Schmerz und sorgen dafür, dass Ihr Tier auch nach der Narkose nicht unter Schmerzen leiden muss.

Sie sehen, es wird alles getan, damit Ihr Liebling schon bald wieder topfit ist und voller Lebensfreude aktiv sein kann.



Das sollten Sie unbedingt beachten!

VOR der Operation

Mahlzeiten

Bitte lassen Sie Ihr Meerschweinchen vor der OP nicht fasten! Das ist nicht notwendig, da Meerschweinchen nicht erbrechen können und ein Fasten bei diesen Tieren schädigend auf den Magen-Darm-Trakt wirkt. Rohfaserreiches Futter (z. B. Heu oder frisches Gras in guter Qualität) sollte auch im Transportbehälter zur Verfügung stehen. Fütterungswechsel vor einer OP sind zu vermeiden, da diese Blähungen hervorrufen können.

Wasser sollte immer gut erreichbar zur Verfügung stehen.



Umgebung

Die Tiere sollten in den Tagen vor der OP in gewohnter Umgebung gehalten werden und die Gruppenzusammensetzung beispielsweise nicht durch Neuzugänge verändert werden.

Transport

Der Käfig sollte sauber sein, insbesondere wenn er zum Transport benutzt wird. Für Meerschweinchen ist es schonender, sie in abgedunkelten, kleineren Boxen zu transportieren. Klettermöglichkeiten sollten nicht angeboten werden, damit die Tiere nach der OP in ihren Transportkäfigen aufwachen können, ohne Gefahr zu laufen, sich zu verletzen.



Auffälligkeiten

Wenn Ihnen vor der Operation bei Ihrem Meerschweinchen **Besonderheiten** (verändertes Fressverhalten, Absondern von der Gruppe, vermehrte Anhänglichkeit etc.) auffallen, **teilen Sie diese bitte unbedingt Ihrem Tierarzt mit.**

Das sollten Sie unbedingt beachten!

NACH der Operation

Transport

Wenn Sie Ihr Meerschweinchen nach der Operation abholen, sollte es auf Sie einen wachen Eindruck machen. Da gerade Heimtiere sehr zur Auskühlung neigen, sollten sie auch in einer **warmen Umgebung** transportiert werden. Daher ist es empfehlenswert, vor allem im Winter, zum Beispiel eine Wärmeflasche zur Abholung mitzubringen.

Mahlzeiten

Stellen Sie Ihrem Tier sofort gewohntes Futter und Wasser zur Verfügung. Wenn Ihr Tier nicht wie üblich Futter aufnimmt, sollten Sie es zufüttern, beispielsweise aus einer Spritze mit aufgelöstem Nagerfutter. Sollte Ihr Tier am Tag nach der OP noch nicht selbstständig fressen, gehen Sie unbedingt zu Ihrem Tierarzt!

Kot- und Urinabsatz dürfen nicht gestört sein. Achten Sie auf Menge und Form des Kotes sowie eventuelle Verfärbungen des Urins.



Umgebung

Durch den Geruch der OP ist es möglich, dass Ihr Tier von der Gruppe isoliert oder sogar attackiert wird. In diesem Fall ist es ratsam, **das operierte Tier vorübergehend zu isolieren** oder mit einem vertrauten Artgenossen zusammenzusetzen, der sich friedlich verhält. Erhöhte Zuneigung kann die Normalisierung der Gruppenstruktur eventuell verzögern, auch wenn sie dem Patienten sicherlich zugute kommt.

Halten Sie Ihr Tier einige Tage nach der OP in **ruhiger, sauberer, warmer und gut belüfteter Umgebung**. Bei entsprechenden Operationen, wie z. B. Kastrationen, sollten die Tiere die ersten Tage nicht auf Einstreu sitzen, sondern besser auf Handtüchern. Auch Sandbäder sind zu entfernen, bis die Wunden in Abheilung sind.

Das sollten Sie unbedingt beachten!

NACH der Operation

Nachbehandlung

Ihr Tier bekommt gegen die postoperativen Schmerzen von Ihrem Tierarzt ein wirksames Schmerzmittel verordnet. Bitte geben Sie dieses auch ein, wenn für Sie keine offensichtlichen Schmerzen zu beobachten sind. Schmerzen sind bei Heimtieren nur ganz schwierig zu erkennen!

Schauen Sie sich regelmäßig die Wundnaht an und achten Sie auf Entzündungszeichen wie Schwellungen, Rötungen, Wundsekret. Heimtiere benagen Wunden gerne und dies kann zu Wundheilungsstörungen auch bei optimaler Versorgung führen. Sehen Sie irgendein Problem, gehen Sie bitte umgehend zu Ihrem Tierarzt!

Falls Ihr Meerschweinbock kastriert worden ist, beachten Sie, dass er für etwa 4 - 6 Wochen von weiblichen Partnern ferngehalten wird, da eine Befruchtung während dieses Zeitraums durchaus noch möglich ist.



Appetitlosigkeit

Sollte Ihr Tier 24 Stunden nach der OP noch nicht gefressen haben, gehen Sie zu Ihrem Tierarzt!

Metacam® 

**Wir wünschen Ihrem
Liebling rasch eine gute
Besserung!**



Diese Broschüre wurde Ihnen
nach erfolgreichem Beratungs-
gespräch von Ihrem Tierarzt
übergeben.

 **Boehringer
Ingelheim**

Tierarztstempel

07-52040132-22 DE-MSP-0010-2022